

फिशर आणि होमिओपॅथिक उपचार

गुदद्वारील वृहसंख्या आजार हे कुण्ठणे प्रकाराने उद्भवतात. त्याचबरोबर धावपल्लीच्या या जीवनात लोकांना संडासासाठी पुरेसा वेळ नसतो. घाईद्वारीने संडास उकणे हा त्याल पर्याय नसून या प्रक्रियेने गुदद्वारास नवकीच जखमा व्हायला सुखात होते.

गुदद्वार तील खालील वृहसंख्या आजार लोकांमध्ये आढळून येणारी वेदनाचबरोबर अणि अवघडून टाकणारी अवस्था आहे. ऋश॒४शी म्हणजे गुदद्वारजवळ चीर पडणे, गुदद्वार म्हणजे शरीराची अवस्था आहे. त्याचबरोबर आतील त्याचबरोबर आतील परिसंकीयी जास्त आकुंचन पावल्यामुळे या भागातील दाब वाढतो आणि गुदद्वारामोतीच्या त्वचेला कमी रक्तपुरुषाठा होते.

ताणामुळे गुदद्वारजवळील लेश्यावारण अणि त्वचा फाटते आणि चीर पडते. कारणे :- १. काही लोकांमध्ये गुदद्वारचे निश्चित कारण समजून येत नाही. २. गुदद्वारातील लेश्यावारण कडक संडासामुळे जखम होणे, हे कारण बचाच्या जुनाट बद्धकोष्ठेतेचा त्रास असलेल्या लोकांमध्ये आढळून येते. ३. गुदद्वारातील रक्तपुरुषाठा करणाऱ्या रक्तपुरुषाठा अभाव हे कारण ८५ टक्के लोकांमध्ये आढळून येत. आल्या रक्तपुरुषाठा परिसंकीयी भागातून जाणाऱ्या रक्तपुरुषाठा दाबल्यामुळे गुदद्वारामोतील दाबवाव वाढतो.

शीरचाल कठीन होण्यामुळे जोर दिल्यानंतर या मागच्या मार्ग मोरदून आतइद्वारा चेंट्रल चालाव्या भाग आतल्या बाजून अनेकिंचक परिसंकीयी आणि आडळून येण्याची एकिंचक परिसंकीयी (Sphincter) भागाने बंद करून ठेवला जातो. या मार्गाच्या वरच्या दोन तीतीयांश भागाला कमी रक्तपुरुषाठा होऊन चिरा पडतात, ४. क्षयरोग, रक्तातील कॅन्सर, गव्हर, इड्स, Crohn's disease, Ulcerative Colitis या आजारांमुळे ही तक्रार उद्भवून, ५. शरीरसंवंधातून उद्भवणारे आजार जसे Syphilis, Herpes,

आणखीन रक्तपुरुषाठा कमी होते. परिणामी गुदद्वाराच्या मागच्या बाजूल चीर पडते अणि ती लवकर भरून येत नाही. परिणामी मलविसंजन करताना तीव्र वेदना होतात. त्याचबरोबर आतील परिसंकीयी जास्त आकुंचन पावल्यामुळे या भागातील दाब वाढतो आणि गुदद्वारामोतीच्या त्वचेला कमी रक्तपुरुषाठा होते.

Human Papilloma Virus इ. संरांजन्य आजार.

६. अनेसर्गिंग क्षरीरसंबंधं.

धोकादायक घटक :- १.

शौचाल कठीण होण्यामुळे, सतत जुलब होण्यामुळे, गुदद्वाराची जाग वैद्यकीय साधनांनी तपासाताना, प्रसूतीवेळी गुदद्वाराल जखमा होऊन या आजाराल सुखावत होऊ शकते. प्रसूतीच्या

आजाराचे प्रमुख कारण असून चुकीच्या खाणाच्या सवरी, व्यायामाच्या अभावामुळे उद्भवतो. यासाठी आहारामध्ये तंतुमय पदार्थाचे जास्तीत जास्त प्रमाणात सेवन करणे, म्हणजेच पालभाजाचे, फलांचे, शेंगाच्या भाज्यांचा, कंडधान्यांचा, सूरा, कफलाच्यांचा वापर करणे, भरून प्रमाणात पाणी प्यावे, २.

पडकांडल जोर न देणे, जुलब झाल्यानंतर तावतोब उपचार करणे,

गुदभागात स्वच्छता बालाणे, ३ आंचोळ झाल्यानंतर थोडा वेळ गरम

पाण्यात गुदमार्गातील आकुंचन कमी होण्यामुळे या मार्गात दाव निर्माण झाल्यामुळे किंवा साधनांचा वापर केल्यामुळे असे होऊ शकते. २. तंतुमय पदार्थाचे अतिक्रम प्रमाणात वापर. ३. मानसिक ताणतणावामुळे परिसंकोचातील स्नानू आकुंचन पावल्यामुळे गुदनिलिंगीतेल दाबवाव वाढतो.

लक्षणे :- १. गुदद्वारात तीव्र वेळी वाळ्याच्या डोक्यामुळे या किंवा साधनांचा वापर केल्यामुळे असे होऊ शकते. २. तंतुमय पदार्थाचे अतिक्रम प्रमाणात वापर. ३. मानसिक ताणतणावामुळे परिसंकोचातील स्नानू आकुंचन पावल्यामुळे गुदनिलिंगीतेल दाबवाव वाढतो.

तक्रारे :- १. गुदद्वारात तीव्र वेळी होणे, यापल्यासारख्या चिरल्यासारख्या, पोल्याल्यासारख्या वेदना, पडकांडल योंताना किंवा झाल्यानंतर होणे, २. अधूनमधून पडसाकांडल लालसर रक्तातील कॅन्सर, गव्हर, इड्स, Crohn's disease, Ulcerative Colitis या आजारांमुळे ही तक्रार उद्भवून, ५. शरीरसंवंधातून उद्भवणारे आजार जसे Syphilis,

Herpes,

उपाय :- १. बद्धकोष्ठता होय वा

वेदना वाढणे, गरम पाण्याने शेकल्यावर बरे वाटणे, २.

शौचाल कडक व जोर द्यावा

लागते, कधी कधी शौचाल चिकट श्लेशयुक्त होणे, ३. तीन महिन्यांपूर्वी डाव्या बाजूचे जांगोतील द्विनियाची शस्त्रक्रिया अणि १५ वर्षांपूर्वी गुदविदारासाठी शस्त्रक्रिया करण्यात करण्यात आली होती

तरवरे. तिने सगव्यादेखत माझा

अपमान केला. ही गोप्त अल सहन झाली नाही आणि तेव्हापासून मला

स्कटदावाचा त्रास सुरु झाला.

आताही माझे माझ्या बायकोशी

पटत नाही. सुनेने भी सांगितलेले

ऐकले नाही. मल उत्तर दिल्ली

मल सहन होत नाही. परंतु मी

माझा राग व्यक्त करत नाही. सध्या

मल नवाबी एकदा रागावली

मल नवाबी घरावट आवडत.

विशेष माहिनी :- १.

तंबाखूसेनावाची सवय, २.

खाणात गोडाची आवड, दुधाची नावड,

३. लघवीची काताना जोर

द्यावा लागणे आणि पूर्ण,

४. बद्धकोष्ठेतेचा त्रास व तंबाखूचे

व्यसन, ५. लघवीची शौचाल

जोर द्यावा लागणे, ६. थंड प्रकृती.

स्वभाव :- तुमच्या

लहानपणाविषयी माहिती सागा. -

८. मल खाल ते ३ बळिंगी आहेत.

केस :- ही एका ६० वर्ष

वयाच्या वृद्धाची केस आहे.

ज्यांना उच्च रक्तातावरोबर

गुदविदाराचा त्रास आहे. १५

वर्षांपूर्वी गुदविदारासाठी शस्त्रक्रिया

करूनही त्यांना वारंवार हात त्रास

उद्भवत होता आणि एकाच जागेवर १० मिनिटेंशी जास्त

मल सहन होत नरो.

तुमचा ताणतणावाविषयी

संगो. - माझे वयाच्या २४ व्या

वर्षी लग्न झाले, मल २ मुले आणि

१ मुली आहे. पूर्वी मल राग,

अन्यायी बिल्कुल सहन होत नरो.

परंतु, आता मी राग व्यक्त करत

नाही. याचे कारण म्हणावे माझ्या

मलीचा ६ वर्षांपूर्वी घटस्कोट

झाला. त्या वेळेस लांच्या माझ्या

मुलीचे लग्न जमवले होते म्हणून

माझ्या बायकोने मलाच दोपी

पडसाकांडल साफ होऊ लागली.

बसण्यासाठीची त्रास व्यापक

संदर्भात तेव्हापासून त्रास

महान्यांपूर्वी शहरात राज्य ग्राहक

आठव्यांदी ठेवली आहेत.

इतर ३३ वर्षांना त्रास

महान्यांपूर्वी त्रास व्यापक

महान्यांपूर्वी त्रास व्यापक