



# मेंदूतील-धोकादायक रक्तस्त्राव आणि होमिओपॅथीक उपचार

Intracranial Hemorrhage झटणजे मेंदूतील रक्तस्त्राव होणे. मेंदूतील रक्तस्त्राव हा एक अणीवाणीचा आजार आहे. कारण मसितकात रक्तस्त्राव वाढत रक्तस्त्राव रक्तदाव तर मेंदूतील दबाव वाढत जातो. ज्यामुळे मेंदूतील मृत पावतात आणि रक्तपुरुठा खंडीत होतो. अतिरिक्त अंदू वाही येऊ शकतो अशावेळी तत्काळ मेंदूचा सीढी स्कैन करून अचूक निदान करतात.

मेंदूतील रक्तस्त्राव अवयव तीव्र आवरणांनी आचारादलेला असतो. ज्याला मसितकात रक्तस्त्राव यांची मेंदूपेशीवर ताप येऊन त्या सुजातात. परिणामी मेंदूला सुज येते. रक्तस्त्राव झालेल्या भागाचा एक गोळा बनतो. ज्याला हिमटोमा असे मृणतात. आजारकालच्या प्रवालित मेडिकल सायन्स्प्रोग्यांनी असा रक्तस्त्राव आजारावर तातारीने शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेताऱ्या.

**कारण :** १. डोक्याला झालेला अपायात हे तरुणांमध्ये आढळतात. मेंदूतील रक्तस्त्रावचे महत्वाचे कारण आहे. २. उच्च रक्तदाव - अनिवार्य अंदू वाही येऊन तकाळात रक्तस्त्रावामुळे रक्तवाहिन्यांना आलेला कुणवटा अंत्युक्रिम अचानक फुटून रक्तस्त्राव होऊन पकतो. ३. सबवृत्तकर्नेंड रक्तस्त्राव - मध्य आणि अंतस्थ मसितक आवरणामध्ये

विक्रिमितुले निराणग रक्तवाहिन्यातील कमकुवतपणा ५. वाढत्या वयानुसार होणारे धमन्याचे आजार ज्यामुळे वाढणारा रक्तदाव हे एक महत्वाचे मेंदूतील रक्तस्त्रावचे कारण उत्तरवायातील रूणांमध्ये दिसून येते. उच्च रक्तदावामुळे नकळत थोडा थोडा रक्तस्त्राव मेंदूतील येत राहतो. ६. रक्तस्त्रावचे आजार जसे की, हिमोफिलिया, सिकल सेल अनेमिआ तसेच पेटलेट्ये आजार यामुळी अंदूत रक्तस्त्राव होऊ येत राहतो. ७. यकृताचे आजार. ८. मेंदूतील रक्तस्त्राव इत्यादी.

**वर्गकरण :-** इन्द्रार्ङ्गशीरी अल रक्तस्त्राव - यांमध्ये मेंदूरेशीमध्ये रक्तस्त्राव होतो. किंवा मेंदूतील पोकळ्यांमध्ये केंद्रीकल्स रक्तस्त्राव होतो. असा मेंदूच्या आतील रक्तस्त्राव सर्वात जास्त धोकादायक असतो.

**एकस्ट्राइक्स्ट्रीअल रक्तस्त्राव -** यांमध्ये रक्तस्त्राव मेंदूच्यावाही पण कटवीच्या आत होतो. याचे तीन प्रकार पुढीलप्रमाणे - १. इंपिड्युल रक्तस्त्राव - यांमध्ये रक्तस्त्राव बाह्य मसितक आवरण आणि कवटी यांच्यामध्ये होतो. महत्वाच्या मसितक धमनील इजा झालामुळे मोद्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होऊन मसितकाच्या आतील दबाव झापाटाने वाढतो. परिणामी रूणण पुर्णपणे बेशुद्ध अवस्थेत जातो. रक्तस्त्राव- बाय्या आणि मध्य मसितक आवरणामधील रोहिण्या फाटल्यामुळे असा होऊन पकतो. २. रक्तस्त्राव होतो. ३. सबवृत्तकर्नेंड रक्तस्त्राव - परंतु सभोवतालच्या घटनांबद्दल त्याना काहीच लागतो.

४. उलटी किंवा मध्यम्ल होणे. ५. अशक्तपणे येऊन सजगता कमी होऊ लागते. ६. काही लिंकांमध्ये हाटीमध्ये अडथळे निराणग होतात. अदी.

**मेंदुला झालेल्या दुखावानीचे परिणाम :-**

१. चेतनाशक्तीवर झालेला दुष्प्रणिणा - मुच्छित अवस्था - यांमध्ये पेपर्ट बेशुद्ध अवस्थेत जातो. पण शारीरिक हालचाली बद असतात. कोमाची अवस्था यांमध्ये रूणण पुर्णपणे बेशुद्ध अवस्थेत असतो. कुठल्याही दाहक तंदिपणामुळे तो जागा होत नाही. काही लोक जागृत असतात. परंतु सभोवतालच्या घटनांबद्दल त्याना काहीच लागतो.

७. अशक्तपणे येऊन तात्काळ आवडता घेऊन बेशुद्धवर्थेत होता. सुरुवातील रूणणला

**तक्रारी :-**

१. रूण तीन दिवसांपासून बेशुद्धवर्थेत होता. सुरुवातील रूणणला

**उपचार :**

केस : - ही एक ३८ वर्षांच्या पुरुषाची केस आहे. जे अचारने मेंदूतील रक्तस्त्रावावाही बेशुद्ध झाले आणि त्यांना तकाळ आय. सी.यू. मध्ये ॲंडमिट करण्यात आले. मेंदूतील महत्वाच्या भागात रक्तस्त्राव झालामुळे त्यांना त्यातून वाचवणे अवघड असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले होते. रूणणला कृत्रिम श्वासोच्चवासावर ठेवण्यात आले होते. मेंदूच्या सी.टी.स्कॅन तपासांमध्ये मेंदूमध्ये १.८ \* १.३ से.मी. एवढा रक्तस्त्राव दोषांद्वारा भागात झालेला आढळून आला.

तक्रारी : - १. रूण तीन दिवसांपासून बेशुद्धवर्थेत होता. सुरुवातील रूणणला

परंतु अचारने चक्करकर आवडते. तो कधीच करण्याची लाची भावना असते. तो कधीच कोणाला दुखवत होती. सतत काहीना काहीरी

जाणवतात आदी.

**कारणी :-**

१. रूण तीन दिवसांपासून बेशुद्धवर्थेत होता. सुरुवातील रूणणला

परंतु अचारने चक्करकर आवडते. तो कधीच

करण्याची लाची भावना असते. तो कधीच

करण्याची ल